КЛІНІЧНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ

АНАМНЕСТИЧНЕ АНКЕТУВАННЯ ЯК СКЛADOVA ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ ОЖИРІННЯ У ДІТЕЙ НА РІВНІ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (результати пілотного опитування респондентів)*

Дячук Д. Д., Яценко Ю. Б., Заболотна І. Е.

*ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
Державного управління справами, м. Київ, Україна
yayubor1970@ukr.net*

Серед факторів ризику розвитку неінфекційних захворювань зайва вага викликає особливе занепокоєння, що зумовлено несприятливими медичними, соціальними та економічними наслідками зростання її поширеності серед різних верств населення [1, 2].

Запровадження анамнестичного анкетування, як складового елементу медико-соціального моніторингу ожиріння серед дітей з метою вивчення сімейних факторів

ризиків розвитку зайвої ваги дозволить забезпечити оптимальні шляхи профілактики ожиріння серед дитячого населення та попередження розвитку захворювань асоційованих із зайвою вагою.

Мета: вивчити серед дітей шкільного віку, які прикріплені для медичного обслуговування до закладу охорони здоров'я, сімейну (спадкову та поведінкову) обтяженість щодо ризику розвитку ожиріння.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

В рамках запровадження медико-соціального моніторингу ожиріння у дітей на рівні закладу охорони здоров'я для оцінки несприятливих факторів сімейного середовища щодо розвитку у дітей зайвої

ваги розроблено та впроваджено анамнестичне опитування батьків, яке включено до програми профілактичних оглядів школярів. Анамнестична анкета містить три блоки запитань відповіді на яких яв-

* Роботу виконано в межах НДР «Розробка моделі організації багатофакторної профілактики та управління якістю медичної допомоги при окремих хронічних неінфекційних захворюваннях прикріпленого населення» (№ держреєстрації 011U002118) у ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

Установою, що фінансує дослідження, є МОЗ України.

Автори гарантують повну відповідальність за все, що опубліковано в статті.

Автори гарантують відсутність конфлікту інтересів і власної фінансової зацікавленості при виконанні роботи та написанні статті.

Рукопис надійшов до редакції 14.01.2020.

Таблиця 1

**Біологічні та соціально-гігієнічні фактори ризику
розвитку зайвої ваги у дітей**

Характеристики (головні компоненти факторного аналізу)	Факторні навантаження (varimax)			
	1	2	3	4
Наявність у близьких родичів дитини (1 і 2 ступінь спорідненості) цукрового діабету 2 типу (бальна градація: так — 2; ні — 1)	0,379	0,575*	-0,390	0,088
Наявність у близьких родичів дитини (1 і 2 ступінь спорідненості) артеріальної гіпертензії (бальна градація: так — 2; ні — 1)	0,026	0,852*	0,041	-0,009
Наявність серед близьких родичів дитини (1 і 2 ступінь спорідненості) таких, що перенесли інфаркт міокарда або інсульт (бальна градація: так — 2; ні — 1)	-0,381	0,747*	0,207	0,132
Наявність у близьких родичів дитини (1 і 2 ступінь спорідненості) ожиріння або надлишкової маси тіла (бальна градація: так — 2; ні — 1)	0,445	0,534*	0,059	0,063
Вживання дитиною чіпсів, фастфудів, солодощів, солодких напоїв на тиждень упродовж останнього місяця (бальна градація: щоденно — 1; 3–4 рази — 2; 2 рази і рідше — 3)	-0,806*	0,056	0,121	-0,121
Вживання дитиною овочів на тиждень упродовж останнього місяця (бальна градація: щоденно — 1; 3–4 рази — 2; 2 рази і рідше — 3)	0,131	0,159	-0,050	0,762*
Вживання дитиною фруктів на тиждень упродовж останнього місяця (бальна градація: щоденно — 1; 3–4 рази — 2; 2 рази і рідше — 3)	0,214	0,216	-0,019	0,787*
Вживання дитиною м'ясних продуктів на тиждень упродовж останнього місяця (бальна градація: щоденно — 1; 3–4 рази — 2; 2 рази і рідше — 3)	-0,038	-0,177	0,091	0,826*
Вживання дитиною рибних продуктів на тиждень упродовж останнього місяця (бальна градація: щоденно — 1; 3–4 рази — 2; 2 рази і рідше — 3)	0,022	0,067	0,715*	0,053
Прогулянки дитини на свіжому повітрі більше однієї години упродовж останнього місяця (бальна градація: щоденно — 1; 3–4 рази на тиждень — 2; 2 рази на тиждень і рідше — 3)	0,064	0,114	0,827*	-0,023
Час перебування дитини за останній місяць упродовж дня за переглядом телевізора, грою за комп'ютером, планшетом тощо (бальна градація: 1–1,5 год/день — 1; 1,5–3 год/день — 2; понад 3 год/день — 3)	0,621*	-0,224	0,499	0,059
Час, який дитина упродовж дня приділяє фізичній активності або займається спортом упродовж останнього місяця (бальна градація: понад 1 год/день — 1; півгодини — 1 год/день — 2; менш ніж 0,5 год/день — 3)	0,656*	0,130	0,380	0,213
% від загальної дисперсії	16,9	17,4	15,1	16,5

Примітка:

* головні компоненти, які мають показник навантаження > 0,5000.

ляють собою шкали з наростанням ознак та формалізовані у бали. Обґрунтування переліку питань анамнестичної анкети базувалося на основі Клінічних практичних настанов Ендокринологічного Товариства «Ожиріння в дітей: визначення, лікування, профілактика», Styne Dennis M. et al. [3] та результатів міжнародного дослідження BOOЗ «Health behaviour in school-aged children (HBSC) study», Inchley Jo et al. [4].

В ході анкетування отримано 90 заповнених анкет, які були розсортовані на дві групи: I група — 75 анкет від батьків у яких діти мали надлишкову масу тіла (індекс маси тіла у межах 85–97-го центилів для даного віку і статі) та ожиріння (індекс маси тіла більше 97-го центилу для даного віку і статі), II група — 15 анкет від батьків у яких діти мали нормальну масу тіла (індекс маси тіла у межах 5–85-го центи-

лю для даного віку і статі). Статистична обробка результатів дослідження проведена у модулях програми Statistica v.6.0. Оцінка сили впливу несприятливих характеристик з якими асоціюється розвиток у дитини зайвої ваги проведена за показником відносного ризику (BP), а ймовірності розвитку у дитини зайвої ваги за умов наявності в неї анамнестичної обтяженості — за показником атрибутивного ризику (AP) з розрахунком чутливості (Se) та специфічності (Sp) обраних нами ознак для аналізу. Прогностична цінність біологічних та соціально-гігієнічних факторів ризику розвитку у дитини зайвої ваги оцінювалась за показником балансової точності $((SE + SP) / 2)$ — AUC (Area Under Curve) з інтерпретацією якості результату за експертною шкалою інтервалів AUC (Winham et al., 2010, Swets, 1988).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Відповідно сучасним рекомендаціям, які базуються на стратегії ризик-менеджменту неінфекційних захворювань, нами розроблена та впроваджена в умовах локальної медичної інформаційної системи на рівні первинної ланки надання медичної допомоги дітям програма виявлення серед дітей шкільного віку таких, які мають зайву вагу та найпоширеніші несприятливі фактори сімейного середовища щодо ризиків її розвитку. Програма скринінгу включала:

- визначення у дітей під час щорічних профілактичних оглядів індексу маси тіла (ІМТ) за центильними таблицями з врахуванням статі і віку дитини;
- вивчення сімейного анамнезу — наявність у родичів 1 і 2 ступеня спорідненості цукрового діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань (інфаркти, інсульти, артеріальна гіпертензія), зайвої ваги;
- вивчення харчового анамнезу (за останній місяць) — вживання на тиждень висококалорійних продуктів харчування (чіпси, фаст-фуд, солодощі, солодкі напої), овочів, фруктів, м'ясних продуктів та риби;

- вивчення анамнезу фізичної активності (за останній місяць) — фізична активність високої інтенсивності (заняття спортом) хвилин/добу, тривалість прогулянок на свіжому повітрі тривалістю годин/добу, час проведений за переглядом телевізора, комп'ютером години/добу.

Первинна обробка результатів анкетування батьків за допомогою багатофакторного аналізу із застосуванням ортогонального перетворення головних факторів (сімейних та поведінкових характеристик) методом varimax дозволила систематизувати та узагальнити результати опитування. Нами встановлено, що всі чотири фактори мають майже однакові внески у загальну дисперсію (табл. 1).

Перший і третій фактори ризику розвитку у дитини зайвої ваги — поведінкові, поєднують характеристики харчування дитини та її фізичну активність. Разом вони описують 31,6% дисперсії (16,9% та 15,1%, відповідно).

До першого фактору увійшли такі показники: надмірне вживання фастфудів та солодких напоїв ($r = -0,806$), тривалий час перебування упродовж дня за переглядом телевізора, грою за комп'ютером, планше-

том ($r = 0,621$) та недостатня фізична активність упродовж дня ($r = 0,656$).

До третього фактору ризику увійшли наступні характеристики: недостатність в раціоні харчування дитини рибних продуктів ($r = 0,715$) та недостатність перебування дитини упродовж дня на свіжому повітрі ($r = 0,827$).

Четвертий фактор — особливості харчування дитини, доповнює перший та третій фактори. Він пояснює 16,5% варіації змінних — недостатнє вживання овочів ($r = 0,762$), фруктів ($r = 0,787$) та м'ясних продуктів ($r = 0,826$).

Другий фактор, який становить 17,4% загальної дисперсії відображає несприятливі сімейні характеристики щодо розви-

тку у дитини зайвої ваги — наявність в родині хворих на цукровий діабет ($r = 0,575$), артеріальну гіпертензію ($r = 0,852$), а також таких, хто хворів на інфаркт міокарда або інсульт ($r = 0,747$) та має надлишкову масу тіла або ожиріння ($r = 0,534$).

Разом всі чотири фактори пояснюють 65,9% варіації головних компонентів факторного аналізу. Частка соціально-гігієнічних факторів (харчування та фізична активність) становить 48,5%, частка біологічних (сімейна схильність до зайвої ваги і наявність обтяженої спадковості щодо найпоширеніших неінфекційних захворювань) — 17,4%.

Отримані результати співпадають із сучасними дослідженнями з вивчення впли-

Рис. 1. Сімейні фактори ризику розвитку зайвої ваги у школярів та частота, з якою вони зустрічалися у групах спостереження.

**Біологічні фактори ризику розвитку зайвої ваги
у школярів**

Характеристика	BP; 95 % ДІ	AP (%)	Se (%)	Sp (%)
Обтяжена спадковість на цукровий діабет 2 типу	1,31; 1,09–1,57	22,4	47,3	88,2
Обтяжена спадковість на артеріальну гіпертензію	1,24; 1,04–1,47	17,9	37,8	88,2
Наявність у родичів 1 і 2 рівня спорідненості випадків гострого інфаркту міокарду або інсульту	1,16; 0,97–1,39	12,6	27,0	88,2
Наявність у родичів 1 і 2 рівня спорідненості зайвої ваги	1,88; 1,27–2,77	43,8	82,4	76,5
Маса тіла у дитини у віці 2 роки > 90 центиля	1,89; 1,04–3,42	41,0	91,9	41,2
Маса тіла у дитини у віці 5 років > 90 центиля	2,92; 1,13–7,56	57,7	95,9	41,2

ву біологічних та соціально-гігієнічних факторів на формування та розвиток зайвої ваги у дітей які доводять, що фізичний розвиток дитини залежить від складної взаємодії генетичного фону з сімейними поведінковими та харчовими стереотипами, факторами шкільного середовища та особливостями поведінки дитини, а також експозиції несприятливого впливу на організм дитини цих факторів, їх інтенсивності, а також комплексності (поєднаного впливу) [5, 6].

Серед школярів які увійшли до сформованих груп спостереження 75 (83,3%) мали обтяжений сімейний анамнез щодо ризику розвитку зайвої ваги (наявність у родичів 1 і 2 ступеня спорідненості цукрового діабету 2 типу, артеріальної гіпертензії, надлишкової маси тіла та/або ожиріння, випадків інфаркту міокарда та/або інсульту). На момент опитування 15 дітей не мали обтяжений сімейний анамнез, більшість з них (66,7%) мала нормальний ІМТ для даного віку і статі. Частота з якою зустрічалися несприятливі сімейні характеристики щодо розвитку у дітей зайвої ваги представлена на рис.1.

За результатами аналізу індивідуальних анамнестичних характеристик встановлено, що серед I групи спостережень частка дітей у яких маса тіла у віці 2 роки була вище 90-го центилю для даного віку і статі становила 89,3%, а серед II групи таких дітей було 66,7% ($p_{\phi} = 0,017$). У 5-річно-

му віці частка таких дітей становила 94,7% та 66,6%, відповідно ($p_{\phi} = 0,002$).

Ризики розвитку у школярів зайвої ваги за умов наявності обтяженого анамнезу представлені у табл. 2.

Серед біологічних факторів найбільшу силу несприятливого впливу щодо розвитку у дитини зайвої ваги мають спадкова схильність на зайву вагу та сімейна обтяженість на цукровий діабет 2 типу. За умов поєднаної спадкової обтяженості на цукровий діабет та надлишкову масу тіла або ожиріння ризик розвитку у дитини зайвої ваги збільшується у 2 рази (BP = 2,17; 95% ДІ: 1,32–3,57), а вірогідність її розвитку підвищується до 50%.

Низькі показники чутливості досліджених характеристик спадковості дітей щодо оцінки ризику розвитку у них зайвої ваги свідчать про те, що не завжди обтяжена спадковість реалізується в патологічну ознаку. Крім біологічних факторів на формування у дітей зайвої ваги впливають й інші, зокрема зайва вага може формуватися під дією соціально-гігієнічних факторів, навіть, за умов відсутності обтяженої спадковості щодо її розвитку. Проте, отримані дані свідчать про достатню інформативність обтяженої спадковості при оцінці ймовірності розвитку у дитини зайвої ваги. Прогностична цінність (AUC) обтяженої спадковості дитини на цукровий діабет 2 типу щодо розвитку у неї зайвої ваги становить 0,68, обтяженої спадковості на арте-

ріальну гіпертензію — 0,63. Достатньо високий рівень інформативності щодо оцінки ризику розвитку зайвої ваги у дітей виявлений для характеристики спадкової обтяженості на надлишкову масу тіла та ожиріння ($Se = 82,4\%$, $Sp = 76,5\%$, $AUC = 0,79$). За дослідженнями Ковальнової В. І. та співавт. (2015) інформативність обтяженої спадковості дитини до ожиріння щодо розвитку в неї зайвої ваги, яка була визначена за критерієм Кульбака, становить 4,7 [7].

Фактором ризику розвитку зайвої ваги у школярів є надлишок маси тіла у дошкільному віці. Прогностична цінність цієї анамнестичної ознаки щодо оцінки вірогідності розвитку зайвої ваги у школярів середньої сили (інтервальні показники AUC знаходяться в межах 0,6–0,7). За рекомендаціями American Academy of Pediatrics визначати індекс маси тіла у дітей та проводити оцінку його змін слід починати з двох років [8].

Ризики розвитку у школярів зайвої ваги за умов несприятливого впливу поведінкових характеристик представлено у таблиці 3.

Отримані нами результати про значення обтяженої спадковості дитини та несприятливих поведінкових факторів щодо розвитку у дітей зайвої ваги співпадають

із результатами сучасних досліджень. За даними Огнева В. А. і Помогайбо К. Г. (2017) наявність надлишкової маси тіла у одного або у двох батьків підвищує ризик розвитку у дитини зайвої ваги у 4 рази, а за умов обтяженої спадковості дитини на гіпертонічну хворобу, цукровий діабет 2-го типу та іншу ендокринну патологію ризик розвитку в неї ожиріння збільшується майже у 3 рази. Науковцями також доведено, що щоденне вживання дитиною висококалорійних продуктів збільшує ризик розвитку в неї зайвої ваги майже у 3 рази, вживання фаст-фуду більше ніж 2 рази на тиждень — у 2,4 рази, щоденне перебування за електронним пристроєм понад 3 годин — у 2 рази [9]. Дослідженням Сорокман Т. В. та співавт. (2016) відзначено, що у дітей, які мають позитивний генетологічний анамнез (несприятлива спадковість до зайвої ваги, наявність у родичів ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, порушень вуглеводного обміну) ризик виникнення ожиріння підвищений у 1,68 рази (за показником відносного ризику, 95% довірчий інтервал якого становить 1,43–1,82) [10].

За інтервалами AUC показники соціально-гігієнічних характеристик, які нами включено для аналізу, знаходяться у межах

Таблиця 3

Соціально-гігієнічні фактори ризику розвитку зайвої ваги у школярів

Характеристика	Групи спостереження			ВР; 95% ДІ	АР (%)
	I (%)	II (%)	рф		
Вживання чіпсів, фастфудів, солодких напоїв більше ніж 3–4 рази на тиждень	88,0	66,7	0,032	1,35; 0,91–2,02	22,6
Вживання овочів менше ніж 2 рази на тиждень	34,7	6,7	0,004	1,24; 1,06–1,44	18,5
Вживання фруктів менше ніж 2 рази на тиждень	26,7	6,7	0,024	1,20; 1,03–1,39	15,5
Вживання м'ясних продуктів менше ніж 2 рази на тиждень	24,0	6,7	0,039	1,18; 1,01–1,38	14,5
Вживання рибних страв менше ніж 2 рази на тиждень	56,0	26,7	0,016	1,22; 1,00–1,48	16,3
Щоденне перебування за електронним пристроєм понад 3 годин	33,3	13,3	0,045	1,17; 0,99–1,38	13,2
Фізична активність менше ніж 0,5 години в день	86,7	60,0	0,014	1,41; 0,95–2,07	25,3

0,6–0,7, що свідчить про середній рівень інформативності оцінки несприятливого впливу цих ознак щодо ризику формування у дитини зайвої ваги.

Таким чином, запровадження в рамках медико-соціального моніторингу ожиріння у школярів стандартизованого анкетного опитування батьків про спадкові та поведінкові характеристики сім'ї де виховується дитина, особливості її фізичного розвитку у дошкільному віці дозволило в умовах

локальної інформаційної системи запровадити облік та моніторинг біологічних та соціально-гігієнічних факторів ризику розвитку зайвої ваги у школярів. На основі моніторингу факторів ризику розвитку ожиріння у дітей розроблено та впроваджуються індивідуалізовані профілактичні втручання з корекції несприятливої поведінки дітей (нераціональне харчування та малорухомий спосіб життя) із залученням сім'ї та проводиться оцінка їх ефективності.

ВИСНОВКИ

1. У формуванні та розвитку зайвої ваги у школярів серед біологічних факторів провідне місце займають обтяжена спадковість дитини на надлишкову масу тіла та ожиріння (BP = 1,88, 95 % ДІ: 1,27–2,77; AP = 43,8 %), цукровий діабет 2 типу (BP = 1,31, 95 % ДІ: 1,09–1,57; AP = 22,4 %) та артеріальну гіпертензію (BP = 1,24, 95 % ДІ: 1,04–1,47; AP = 17,9 %).
2. Вірогідність розвитку зайвої ваги у школярів за умов наявності у них маси тіла у віці 2 роки > 90 центиля становить 41,0 % (BP = 1,89, 95 % ДІ: 1,04–3,42). Вірогідність розвитку зайвої ваги у школярів за умов наявності у них маси тіла у віці 5 років > 90 центиля — 57,7 % (BP = 2,92, 95 % ДІ: 1,13–7,56).
3. Соціально-гігієнічні фактори — нераціональне харчування та низька фізична активність складають несприятливий фон середньої сили щодо формування та розвитку у дитини зайвої ваги (AUC = 0,6–0,7).
4. Виявлення у дітей несприятливих спадкових та поведінкових предикторів ожиріння дозволить своєчасно організувати заходи з профілактики розвитку зайвої ваги, які спрямовані на формування прихильності батьків до збалансованого харчування дитини та орієнтації сімейного стереотипу на здоровий спосіб життя.

ЛІТЕРАТУРА (REFERENCES)

1. Noorzada O. Adverse Childhood Experiences and the Association with Childhood Obesity: A Cross-Sectional Study of the U.S. National Survey of Children's Health (NSCH), 2011-2012, *Georgia State University*, 2016: 152 p. https://scholarworks.gsu.edu/iph_theses/477.
2. Tremmel M, Gerdtham Ulf-G, Nilsson PM, Saha S. *Int J Environ Res Public Health* 2017; 14(4): 435. <https://doi.org/10.3390/ijerph14040435>.
3. Styne DM, Arslanian SA, Connor EL, et al. *J Clin Endocrinol Metab* 2017; 102(3): 709-757. <https://doi.org/10.1210/je.2016-2573>.
4. Inchley J, Currie D, Young T, et al. Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being (health behaviour in school-aged children (HBSC) study: international report from the 2013/2014 survey), *Copenhagene*, 2016: 292 p. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/303438/HSBC-No.7-Growing-up-unequal-Full-Report.pdf?ua=1.
5. Katzmarzyk PT, Chaput JP, Fogelholm M, et al. *Nutrients* 2019; 11(4): E848. <https://doi.org/10.3390/nu11040848>.
6. Reuter CP, de Mello ED, da Silva PT, et al. *J Obesity* 2018; 2018. <https://doi.org/10.1155/2018/6128034>.
7. Koval'ova VI, Burdejko OA, Kosovcova GV. *Faktory Eksperymental'noi' Evoljucii'* 2015; 6: 201-205.
8. 2016 recommendations for preventive pediatric health care (Committee on Practice and Ambulatory Medicine and Bright Futures Periodicity Schedule Workgroup). *Pediatrics* 2016;137(1). doi: 10.1542/peds.2015-3908.
9. Ognjev VA, Pomogajbo KG. *Mizhnar Med Zhurn* 2017; 4: 92-66.
10. Sorokman TV, Popeljuk OMV, Ushakova KJu. *Zdorov'e Rebenka* 2016; 2(70): 29-32.

**АНАМНЕСТИЧНЕ АНКЕТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЗАПРОВАДЖЕННЯ
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ ОЖИРІННЯ У ДІТЕЙ
НА РІВНІ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
(результати пілотного опитування респондентів)**

Дячук Д. Д., Ященко Ю. Б., Заболотна І. Е.

ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»

Державного управління справами, м. Київ, Україна

yaubor1970@ukr.net

Мета: вивчити серед дітей шкільного віку, які прикріплені для медичного обслуговування до закладу охорони здоров'я, сімейну (спадкову та поведінкову) обтяженість щодо ризику розвитку ожиріння.

До програми профілактичних оглядів школярів включено анамнестичне опитування батьків із формалізацією відповідей за шкалами із наростанням ознак. В ході анкетування отримано 90 заповнених анкет.

Встановлено, що у розвитку зайвої ваги у школярів серед біологічних факторів провідне місце займають: обтяжена спадковість дитини на надлишкову масу тіла та ожиріння (BP = 1,88, 95%ДІ: 1,27–2,77; AP = 43,8%), цукровий діабет 2 типу (BP = 1,31, 95%ДІ: 1,09–1,57; AP = 22,4%) та на артеріальну гіпертензію (BP = 1,24, 95%ДІ: 1,04–1,47; AP = 17,9%). Вірогідність розвитку зайвої ваги у школярів за умов наявності у них у віці 2 років маси тіла > 90 центиля становить 41,0% (BP = 1,89, 95%ДІ: 1,04–3,42). Вірогідність розвитку зайвої ваги у школярів за умов наявності у них маси тіла у віці 5 років > 90 центиля — 57,7% (BP = 2,92, 95%ДІ: 1,13–7,56). Соціально-гігієнічні фактори — нераціональне харчування та низька фізична активність складають несприятливий фон середньої сили щодо формування та розвитку у дитини зайвої ваги (AUC = 0,6–0,7).

Запровадження заходів з виявлення несприятливих спадкових та поведінкових предикторів ожиріння у дітей дозволить своєчасно організувати заходи з профілактики розвитку зайвої ваги шляхом формування прихильності батьків до збалансованого харчування дитини та орієнтації сімейного стереотипу на здоровий спосіб життя.

Ключові слова: діти, ожиріння, надлишкова маса тіла, фактори ризику.

**АНАМНЕСТИЧЕСКОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ
НА УРОВНЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(результаты пилотного опроса респондентов)**

Дячук Д. Д., Ященко Ю. Б., Заболотная И. Э.

ГНУ «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины»

Государственного управления делами, г. Киев, Украина

yaubor1970@ukr.net

Цель: изучить у детей школьного возраста, которые прикреплены для медицинского обслуживания к учреждению здравоохранения, семейную (наследственную и поведенческую) отягощенность в отношении риска развития ожирения.

В программу профилактических осмотров школьников включён анамнестический опрос родителей с формализацией ответов по шкалам с нарастанием признаков. Проанализировано 90 анкет.

Из биологических факторов ведущее место в развитии избыточного веса у школьников занимают отягощенная наследственность ребенка избыточной массой тела и ожирением (OR = 1,88, 95% ДИ: 1,27–2,77; AP = 43,8%), сахарным диабетом 2 типа (OR = 1,31, 95% ДИ: 1,09–1,57; AP = 22,4%) и артериальной гипертензией (OR = 1,24, 95% ДИ: 1,04–1,47; AP = 17,9%). Если у ребенка в 2 года масса тела превышает 90-й центиль, то вероятность развития у него в школьном возрасте избыточной массы тела составляет 41,0% (OR = 1,89, 95% ДИ: 1,04–3,42). С вероятностью 57,7% можно прогнозировать развитие избыточного веса у школьника если в 5-летнем возрасте у него масса тела была выше 90-го центиля (OR = 2,92, 95% ДИ: 1,13–7,56). Социально-гигиенические факторы — нерациональное питание и низкая физическая активность составляют неблагоприятный фон средней силы по формированию и развитию у ребенка избыточного веса (AUC = 0,6–0,7).

Выявление у детей неблагоприятных наследственных и поведенческих предикторов ожирения позволит своевременно организовать мероприятия по профилактике развития избыточной массы тела путем формирования приверженности родителей к сбалансированному питанию ребенка и ориентации семейного стереотипа на здоровый образ жизни.

Ключевые слова: дети, ожирение, избыточная масса тела, факторы риска.

**THE ANAMNESTIC INTERVIEW FOCUSING ON IMPLEMENTATION
OF SOCIAL HEALTH OBESITY SURVEILLANCE AMONG CHILDREN
WITHIN THE INSTITUTIONS OF HEALTH CARE
(based on the results of the pilot survey)**

D. D. Diachuk, Yu. B. Yashchenko, I. E. Zabolotna

*State Institution of Science «Research and Practical Center of Preventive and Clinical Medicine»
State Administrative Department, Kyiv, Ukraine
yayubor1970@ukr.net*

Aim: consideration to the burden behavioral function of maternity and hereditary among schoolchildren, which are assigned to the building of health care and turn up obesity risk. The parent anamnestic interview to the program of preventive examinations of the schoolchildren being classified as the growth of the scale characteristics. There were presented over 90 completed forms.

It has been defined as the overweight progression in the schoolchildren. The leading role is occupied by the reasons underlying overweight and obesity and the child heredity, considering the body weight excess and obesity: relative risk (RR) = 1.88, 95%CI: 1.27–2.77; attributable risk (AR) = 43.8%; the diabetes mellitus type 2: RR = 1.31, 95% CI: 1.09–1.57; AR = 22.4%; as the result of arterial hypertension: RR = 1.24, 95%CI: 1.04–1.47; AR = 17.9%. The probability of increasing overweight in the schoolchildren in the time at 2 years > 90th centiles — 41.0% (RR = 1.89, 95%CI: 1.04–3.42). The probability of increasing overweight in the schoolchildren in the time at 5 years, when the body changing its view > 90th centiles — 57.7% (RR = 2.92, 95%CI: 1.13–7.56).

The social and hygienic factors — not balanced diet, less physical activity represent an unfavorable context of the average strength to the emergence and increase of the children overweight (Area Under Curve = 0.6–0.7).

The introduction of the facilities to identify adverse hereditary and behavioral predictors of obesity in the children will allow timely organized of the measures to prevent the increasing of overweight by forming parents' commitment to balanced diet and the stereotype orientation to a healthy family lifestyle.

Key words: children, obesity, overweight, risk factors.